

포경수술을 해야 하나요?

부산성모병원
소아비뇨클리닉
강동일 과장



궁금증 1

포경 phimosis 이란?



1. 섬유화로 인해 생긴 협착으로 귀두부가 완전히 노출되지 않은 상태를 말함

2. 신생아에서 귀두와 포피가 유착되어 뒤로 당겨지지 않는 생리적 포경과 포피가 길어 뒤로 당겨지지 않는 과잉포피가 있다.

궁금증 2

포경수술의 장점은 무엇인가요?

1. 각종 성병감염을 감소시킴 (HIV, HSV, HPV)
2. 귀두 포피염 예방
3. 상행 요로감염 및 음경암 예방



궁금증 3

포경수술은 언제 하나요?

1. 국소 마취가 가능한 나이가 좋습니다.

대략 초6~ 중2 사이에 시행합니다.



2. 반복되는 귀두포피염, 요로감염이나 방광요관



역류가 있는 소아의 경우 전신마취하에서 시행하

기도 합니다.



궁금증 4

귀두포피염이 무엇인가요?

1. 귀두와 포피에 염증이 생기는 질환으로 포경
일때 발생함

2. 치료

1) 비누와 따뜻한 물로 하루에 2-3회 씻어줌

2) 국소항생제 연고

3) 심하면 경구용 항생제 치료

4) 배농이 필요한 경우도 있음

궁금증 5



귀두지(smegma)란

1. 상피조직이 각질화되어 탈락하면서 **흰 치즈 모양의 귀두지**를 만듦
2. 귀두지는 귀두와 포피사이에서 틈을 만들고 **커쳐서 두 부위를 분리한다.**
3. 간헐적인 발기를 유발시킴
4. **강제적인 제거**는 귀두의 자연적인 귀두의 성장을 방해해서 이차적 포경 유발 가능성이 있으므로 **주의한다.**

궁금증 6

포경수술을 할까요?

결론적으로

모든 아동에게 시행할 필요는 없지만

여러 장점으로 인해 포경수술을 하는 것이

유리합니다.

